

DOCTORIS  
FERDINANDI DE  
SOLA MEDICI HISPALENSIS

sis demittendo sanguine in pleuritide  
secūdam Hipocratis, & Galeni  
sententiam iudicium.



MAGNA FUIT CONTEN-  
tio inter antiquos Medicos de san-  
guine mittendo in pleuritide scili-  
cet, ex qua parte fieri debeat, græci  
sere omnes ex eadem asfirmantes  
Arabes autem ex contraria, sed re-  
centiores facta vtriusque curatio-  
nis experiētia barbarorum opinio-  
nem tanquam perniciosam explo-  
derunt multi tamē iudicātes se alicuius non esse factores,  
(quod iam relictum est:) iterum ad arenā redeūt, sic mo-  
do quidam Medicus Hispalensis repugnantibus reliquis  
hāc defendere opinionē conatur cuius rationes hæc sunt.

Prima existente vulnere in vno latere ex altero mitti-  
mus sanguinem reuulsionis gratia, nam ex eodem magis  
concitaretur fluxus ergo similiter in pleuritide, patet ea-  
de est ratio vtriusque quia sicuti in primo casu reuelimus  
sic & in altero.

*Argu.*

Secūda eadem est ratio præcautionis, & curationis, sed  
in præcautione sanguinem mittimus ex opposito latere,  
reuulsionis gratia ergo, & in curatione, præobatur eadem  
causa quæ incepta sobet affectum eandem efficit cōtinua-  
ta, sed sic se habet vbi timetur fluxus, & vbi iam fluxit ergo  
sicuti in primo casu ex latere opposito debet fieri sic & in  
secundo casu.

Tercia Galenus multis in locis docet, quod longissi-

me a parte inflammata est abocandus humor, sed misso sanguine ex proprio latere nō remouetur, sed potius atra humor ergo nullo modo est facienda.

Quarto in omni inflammatione faciēda est fluxus in principio, ergo in omni inflāmatione in principio est rebelendum, sed ex proprio latere reuulsio fieri non potest ergo ex opposito est exercenda, probatur reuulsio est ad vocatio humorum contrario motu quem habet, sed sanguinis missio ex proprio latere non dat humoribus contrarium motum, ergo non fit ex eo reuulsio.

Quinto reuulsio si cognoscitur origo fluxionis ad originem fluxionis est exercēda, sed vena cava fere semper est origo fluxionis, siquidem fere semper tota massa sanguinaria prius putrescit, & ex putrefactione separat natura, quod inflāmationem causat, ergo ad ipsam venā cauā est reuocanda fluxio, sed id non fit ex proprio, sed ex opposito latere ergo semper ex eo est exercēda rebulsio.

*Aucto.* Auctoritatibus etiam hanc suam fulcire possumus opinionem, 1. ex Hipocrate secūdo de natura humana, vbi asserit longissime & in contrarium a parte inflāmata auocandos esse humores, & Galenus 13. methodi, vbi docet quod laborante manu crus scharificetur, id etiam multis in locis ait & Celsus lib. 2. cap. 11. humero laborante reliquam scharificare censet, idem iudicat Aetius tādē inter omnes vt magnus, Achilles ab eis Auicena proponitur, cui tota tribuitur inuencio iste autem lib. 3. sem. 10. trat. 5. cap. 1. in pleuritide & aliis internis inflāmationibus iubet secare venam in maleolo contrario in longitudinem, & postea in brachio contrario vltimo ex proprio primo quādo plenitudo est magna, vt sit ex maiori distantia ex cruce quādo tāta non est ex contrario brachio hęc sunt rationes & auctoritates quibus hic magnus inuentor a consortio medicorum separatur.

*Notād.* Sed vt in hac difficultate quę maxima & necessarissima pro humana saluti est, certa ab incertis separemus, aliqua sunt notanda, & presuponēda, & primum erit, quod  
omnis

omnis methodica cūratio debet procedere indicationibus, & quod si simplex sit morbus, simplici indicatione curatur, si vero compositus composita, & similiter quod in vno morbo est duplex indicatio, vna quæ summitur a causa alia vero ab ipso affectu.

Secundo aduertendum est, quod in indicationibus cōplicatis hic seruetur ordo, quod ad vrgenciozem consilium curantis prius aplicetur, & si sint equales, ad id quod habet cause rationem & conditionis sine qua non, & in morbo cum causa prius a causa postea ad ipsum id metho dice procedēdo, nam si aliquis vrget ad vrgenciozem vt dixi & si equaliter ad omnes equaliter.

Tertio aduertendum est, quod causa tripliciter nobis indicat, ex se primo ex motu ad aliquam partem, & tunc ex postulat reuulsionē, quæ in cōtrarium fit, secundo ex modo motus vt si parum fluit & iā est fluxa et tūc ex postulat derivatiōnē, tertio quando iam est fluxa et tūc ex postulat a parte separationem, quæ dicitur euacuatio.

Quarto aduertendum est, pleuritidem morbum esse constantem ex duplici causæ motu exfluente quæ dicitur antecedens, & ex fluxa quæ in mediate sonet affectū & dicitur coniuncta: & quod ratione huius vltimę scilicet coniūctæ omnia signa quinque pactonomica pleuritidis, si vera est, subboriuntur: nam febris in hoc morbo (vt ab ea incipiamus) accidentalis est dependens a putrefactione causę coniūctæ & non a putrefactione facta in vena cava, quod ex eo patet: quia vrina est optima, quod non esset si a putredine totius dependeret, quod aduertit Hipocrates in prognosticis, & confirmat Galenus tertio epidemix seccione secūda tex. 6. cū sit vrina bona in pleuritide non est bonū nec malum mala, vero malū: quia primum nō ostēdit, quod est in parte inflāmata, cuius ratione sit morbus, secundam vero ostendit morbi cōplicationē, quod malū est, vnde cōstat falsū esse asserere sepe, ex putredine facta in vena cava procedere pleuritidē inflāmationē similiter dolor ex humore fluxo cōcitur, quia

soluet continuū excitando tumorē & tensionē in pleura, cuius ratione resultat difficultas respirationis, tussis que ex eo quod resudat ex cōiūcta causa pulmōni que cōmunicatur, prouenit, quod quando maximē liquidum est, dilabitur & non expulitur, aut quando crassissimum quia expelli non potest, ferrinus tandem pulsus ex pleurę tensione fit, propter quod arteriæ reduntur tensæ distenta tunicā intro eas vestiente quę vna cū pleura est.

Quinto notandum est, omnes euacuationes tan reuulsorias, quā euacuatorias fieri debere secūdū rectum, quia sic magnifice pro sunt, cōtrariæ vero nocēt euacuata materia quæ euacuari non debebat nocentē in corpore relictā, quod Hipocrates affirmat. 6. Epidemie Sec. 2. tex. 12. 13. 14. & 15. & Galenus libro de Sanguinis missione cap. 15. 16. & 17. & 5. Methodi cap. 3. & 3. discursibus ca. 3. & 2. ad Glaueonē cap. 2. & ratio est: quia partes, quę edirecto positæ sunt, magis inter se communicant, & fruūtur, vt Galenus docet 14. de vsu partium cap. 7. & de constitutione artis medicę cap. 17. & libro de Rigore cap. 7. ante finē vbi hæc proponit verba, alia enim vena cum alia corporis parte cōmunionem habet, & per rectum semper euacuationes facere oportet, nā si venas nil cum affecta parte rectum habentes incidere, nec affectam partem sanabis, & sanā semper lades, &c. Et quia id ab omnibus & ab aduersario recipitur rectitudinem seruandam esse, solis autoritatibus præsupponitur.

Sexto Aduertendum est, rectitudinem constituendam esse in societate partium per communes venas proxime ab eodem trunco ductas per communia officia communes cavitates & meatus, simul cum recto partium posito, quod vero fiat per communes vias ab omnibus vniuersimiliter recipitur, quia si reuocatio fieri debet per eadem venas per quas fit, necessarium est, quod sint communes & inter se cōnecxę: sed quod hoc non sufficiat, & simul sit necessarium quod communicent per officia cavitates & meatus occultos, ex eo patet, quod sanguinis missio ex la-

tere sinistro in inflammatione iecoris, aut fluxus sanguinis ex nare sinistro reprobat, quia nō est secūdū rectū, & sit per communes venas, quia equaliter ab eodem iecore distribuuntur & distant, non sufficit ergo quia requiritur amplius ad rectitudinem, & quod hoc totum non sufficiat sine recta partium positione probatur ex eo quod Saphena exterior scifa maioris iuamenti est in sciaticha quam interna, & tan vna quam altera seruat vasorum communitatem, per communes venas orificia & oculos meatus, sed non est eadem positio partis, nam magis recta est exterior quam interna, & ideo magis prodest, quod optime docet Hipocrates 6. Aphoris 36. & confirmat Auicena fen. 4. lib. 1. cap. 20. ante finem cum ait & ratio quidem facit oportere vt Saphena & sciaticha sint eiusdem iuamenti, sed experimentum facit vt operatio sciaticæ plurimū cōueniat dolori sciaticæ, & illud est propter aspectū eius &c. ex quo patet rectitudinem tantopere ab Hipocrate Galeno & reliquis decantatam in hoc consistere, quod comunicent per venas & meatus & recte sin positæ cū parte, vnde patet quod dextrum cū sinistro brachio nullam seruat cōsuetudinem nec venarum nec partium positionē nec meatum patet, quia communicatio est, quando orificia venarum inter se oscula osculis per anasthomosim sic dictam a Galeno comunicant, & nō quia ex magno trūco de ducantur, quia sic omnes rectitudinem seruarent, & non proponetur preceptum, vbi necessariū non erat, sed posuit & celebrat, vt in omni reuulsione rectitudo seruetur, ergo quia eam intelligit vt diximus destra cum dextris & sinistra cum sinistris, & id multis experimentis cōprobatur vidimus quotidie a destra parte capitis de fluxionem podagricam propenire, & a pede ad caput aurā frigidam epilepsiam concitantem ascēdere, ab vno tamē latere in aliud nullus medicorum, nec vidit, nec timet, nec docet, ergo quia non seruat rectitudinem, sed medicus qui naturæ est imitator non contrario modo, ac natura operatur, operari debet, nam tunc non medicus,

sed

sed carniphex nōminari possit, huc accēdit maxima cōn-  
gruentia, quæ summitur ex eo, quod natura multas dupli-  
cabit partes & eas separabit, vt si vna periret, altera con-  
seruaretur, ergo si vna seruari post & ledi, altera ileſa, est  
quia per alias vias & oculos meatus tan causa nocēs quā  
spiritus conseruatibus ad eam peruenire potest.

*Obsec.*

Dicitis tamen non contrariatur quod Galenus 3. de fra-  
cturis com. 10. affirmet, rebulsionem fieri debere ad dex-  
tris ad sinistra, nam id in eodem latere intelligi debet, vt  
videre est in capite, quod cū sit vnum est destra & sinistra  
pars. Non vero latus cōtrariū intelligitur, quia dicit serua-  
ta rectitudine, quæ nō seruaretur, si nō esset in eadē parte.

*Secunda*

Nec amplius contradicit dicitis, quod aliqui affirmet  
in fibris rectis consistere rectitudinem, nam id falsum est  
nam fibræ rectæ atrahunt, & sanguis in Phlebotomia nō  
trahitur, sed expelitur cōcitata natura propter dolorem.  
& ligationem factam in parte.

*Tertia.*

Multo minus huic repngnat rectitudo, quā noster ma-  
gnus inuentor affert, sibi vt vult iudicat in corpore fluc-  
xus & refluxus sanguinis, vt si sanguis esset in venis vt in  
vtre aqua, non aduertens, sanguinem a venis huc, & illuc  
moueri a facultatibus in illis consistentibus, & quod non  
potest mitti nisi vbi sit communitas & consensus requisi-  
tus, vt natura assuescit, sed cū id quod est, naturā imitari  
sit vere medicū quod ad veritat oportet ad curationem.

*Quarta.*

Nec amplius obstat quod ait Hippocrates in libro de ali-  
mento & 6. Epidemie sec. 6. tex. 1. scilicet cōfluxio vna  
conspiratio vna omnia omnibus cōſenciunt, quod etiam  
confirmat Galenus lib. 3. de facultatibus cap. 3. & de cau-  
sis pulsuum cap. 12. nam id intelligendum est ex commu-  
ni confesu omnium partium (quod optime inter omnes  
meo videri ostendit Stephanus Ateniensis magnus & an-  
tiquus Galeni commentator, super primum ad Glauco-  
nem) non vero de particulari requisito ad sanguinis mis-  
sionem, quæ rectitudo dicitur vt monuimus, & affirmat  
Galenus libro de sanguinis missione cap. 19. in principio.

Septimo

Septimo addertendum est ; quod in reuulsione præter  
rectitudinem etiam requiritur contrarietas, quam opti-  
me proponit Galenus in libro de reuulsione, cū ait, quod  
est quadruplex supra & infra, ab intro ad extra, a dextris  
ad sinistra, & ante & retro, id etiā affirmat. 5. meth. 3. &  
5. Aphorif. 68. & quod semper est seruāda aliqua cōtrarie-  
tas nō omnes simul: nā quādo sit secūdū omnes, non pro-  
dest, quia non seruat rectitudinem vt supra diximus, &  
ipse Auicena licet in reliquo cecus agnouit fen. 4. lib. 1.  
cap. 3. ad medium cum ait non oportet quidem, vt in  
duas Diametros prolongationem facias, sed in vna tan-  
tum quæ sit diameter magis longinqua, nam si materia  
fuerit in supremo dextrę partis non erit trahenda, ad in-  
fimum sinistrae & hoc est illud quod est magis necessa-  
rium &c. Reuulsio tamen proprie dicta, semper fieri de-  
bet cū vna harum contrarietate hæc contrarietas in tam  
parua distātia esse solet, vt in vna & eadē parte fieri possit  
& debeat secūdū variū sitū, vt V. g. quādo in capite fit re-  
uulsio a parte anteriore ad posteriorem, fieri tamen po-  
test in distantissima parte seruata rectitudine, vt fecit Ga-  
lenus lib. artis medicæ 99. aliquando vero ad originem  
fluxionis, quæ magis proprie dicitur reuulsio, si cognos-  
catur quod elegāter Galenus docet 1. ad Glaucionem 14.  
Origo tamen fluxionis aliquando pars proxima aliquan-  
do distans est & aliquādo distātissima potest esse, in quo  
casu quando constat medico de origine fluxionis semper  
ad ipsam originem rebelere debet, quia nulla alia ratio-  
ne cōmodius quodlibet malum potest impidiri: secūdū  
quā doctrinā Galen. 5. Meth. 13. reuelit humores a capi-  
te ad pulmones fluentes medicamētis calidissimis capiti  
oppositis vt taspia, &c. & 3. de locis 7. ante finem in pue-  
ro epileptico auram frigidam acruræ ad cerebrum ascen-  
dentem reuelit quidem cucurbitulas & vincula cruri apo-  
nēdo & vstrones, & lib. de sanguinis missione 18. in recē-  
tirenū inflammatione prius sanguinē mittit ex brachio & nō  
ex cruribus, quādo adest plenitudo, etiā si renes cōstituti  
sint in medio supernarū & infernarū partiū, quia in partibus

bus superioribus magis redūdat sanguis, & sua natua gra-  
uitate potius ad iunatur ad descēsum, & sic videtur, quod  
sit origo fluxionis & ad illam reuocandum esse sanguinē;  
quando vero non constat medico de origine fluxionis,  
reuulsio ad maxime distantia loca, seruata rectitudine  
dicta, est exercenda, vt securius fiat, & hæc est causa  
quare in affectibus capitis fricamus & abluimus crura ad  
rebelendam doloris causam, quæ doctrina debet intelli-  
gi in præcautoria reuulsione, quæ fit sanitatis tempore an-  
te quam humores cōfluant & consuetā inflāmationē ge-  
nerent, & in hoc sensu intelligit Galenus Hippocratis sen-  
tentiam lib. 2. de natura humana tex. 9. vbi ait venarum  
secciones procul faciendas esse a locis in quibus sanguis  
colligi & dolor excitari consuevit vt natura a suescat hu-  
mores ad alias partes trāsmittere, &c. Reuulsio tamen cu-  
ratoria nō est facienda ad lōginquas sed ad oppositas tan-  
tum vt docet Hip. 6. Epidemie sec. 2. comēt. 29. & 5.  
Aphor. 68. & libro artis medicæ 95. & in opposita parte  
potest esse talis positio, vt simul fiat reuulsio & euacuatio  
si affectus vrgeat, quia vbi est periculi in minentiā nō vñ  
ca solum indicatione sed duplici est pugnandum & ratio  
est, quia non solum intendimus rebelere & fluxionem si-  
stere, sed id quod iam est in fluxum pro affectus genera-  
tione euacuare, quo euacuato similiter fluxioni succurri-  
mus quia non solum ad causam sed ad eius principium est  
accedendum, vt ait Galenus, a quo mutuatus est Auicena  
sem. 4. lib. 1. sciato quando aasserit & cū ad diuersum tra-  
here volueris dolorem prius seda sedatur tamen euacua-  
ta causa distendente, quæ est humor in parte contentus &  
in hoc sensu debent interpretari difcilia Hippocratis ver-  
ba 6 Epidemie sec. 2. tex. 8. cum inquit renitenti siste-  
re id est vt Galenus aduertit in cōmentario toto fluxionis  
tempore non esse remanēdum cum remediis reuulsoriis  
sed interponendum esse aliquod tempus euacuationi hu-  
moris pecantis & in affecta parte contenti, postea reuer-  
tēdum esse ad auxilia reuulsoria, nam sic magis proficiēt  
remedia, calor enim, & dolor, & molestia partis magis  
irritant,



Irritant & concitant fluxionem, & hoc præcipue habet locum in internis inflammationibus in quibus non solum intendimus reuelere causam fluentem, sed quod fluxum est propter mortis imminetiam, quia iusta partes principes existit & quia fluxionis occasio est.

His sic propositis 1. concl. questionis responsiva proponitur, quæ sic se habet in vera pleuritide, quæ suis sit firmata sint opmatibus non est exercenda solum euacuatio reuulsoria, sed simul rebelere deriuare & euacuare debemus. 1. concl.

Probatur concl. hæc ubi complicatæ sunt indicationes, & omnes equaliter vrgent, si vnicò remedio possumus omnibus succurrere, ex meth. constat quod fiat, sed sic se habet pleuritis vera ergo prob. ans. in pleuritide, causa, quæ fluit, indicat reuulsionem, quæ iusta partem est deriuationem, & quæ fluxa euacuationem: & omnes equaliter vrgent, & magis fluxa quia quod iam fluxum est, magis molestat: siquidẽ concitat inflammationem iusta cor ergo omnibus equaliter est succurrendũ prob. minor quod scilicet id fieri possit vnica euacuatione, si humor trahitur ad contrariũ aut ad originẽ fluxionis sit reuulsio, & si sit per venas cõmunes & proximas sit euacustio & deriuatio simul: sed talis vena eligi potest: ergo & fieri talis euacuatio vt infra latius probabo in certia cõcl.

Ex latere opposito nulla euacuatio fieri potest reuulsoria deriuatoria, nec euacuatoria. Hęc e cõcl. duas habet partes quoad vnũ scilicet, quod nõ deriuat, nec euacuet præterquam quod ipsi aduersarii fatentur Gal. aperte docet lib. de sanguinis missione 16. quo ad aliã. s. quod nõ reuelat sic prob. ab omnibus est receptũ, & a Gal. sepius de cantarũ, in reuulsione requiri rectitudinẽ, sed sanguinis missio ex latere opposito nullã seruat: ergo nec fieri ex illa reuulsio potest: quod eam nõ seruet prob. rectitudo cõsistit in cõmunionẽ valorũ meatũ, & recto partium positu vt supra probauimus, sed in aduersa sanguinis missione, nec est cõmunicatio vasorum (quia non cõmunicat nisi in origine de qua cõmunicatio nõ dicitur, quia secundũ ipsam omnes cõmunicat & non esset necessaria aduertentia) nec positionem partium, nec meatum nõ habet: ergo nullam seruat rectitudinem & per consequens, 2. concl.

Secūdo prob. reuulsio fieri debet ad originē fluxionis si cognoscatur, & si nō cognoscatur saltem ubi timetur, sed latus oppositū nō potest esse fluxionis origo: ergo nūquā ad illud est, reuocāndus humor prob. fluxiones omnes secūdū rectū exercet natura: ergo & auersiones earū fieri debēt secūdū rectū sed pars illa nō est secūdū rectū: ergo nec est origo fluxionis.

*Obiectio.*

Sed obicies, vno crure laborāte reliquū iubet scharificare Gal. in 13. meth. & ipse iubet, vt seruetur rectitudo ergo, aut aliu l in vniuer salibus docet Gal. quam exercet aut est falsus.

Hinc dubitationi respondent aliqui, Galenū fallum asserere in presenti, & quod sibi contrariatur in vniuersalibus præceptis, quos insequi debemus, & quod nullo modo ex alio crure nisi ex brachio sanguinem mirēdom esse, sed hæc responsio non est recipienda, siquidem Gal. cōtraditionē in ponit, quod prouenit ex praua eius intelligētia & sic in hoc turpiter sunt alucinati Auer. & mordicus Argenterius.

Et sic respondemus, duplici ratione oportere vno crure laborante alterum scharificare 1. quia in inflammationibus exterioribus, in quibus non est maxima vrgencia, parum refert an omni moda seruetur rectitudo, 2. ne id quod a natura extra ex pulsū est, iterum ad amplas venas retrocedat, & cordi communicetur, quod si fiat ex brachio, cōtinget, quod optime aduertit Auicena quando ait, & caue, cum ad diuersum trahere volueris, ne humor transeat per membrum principale, quod maximum est absurdū quoties morbus prestat indutias, quia curatio fieri debet tuto, & non est tutum, quod est in parte inflammata ad regionem cordis aduecare, quod fit, si ex brachio mittatur sanguis.

*Obiectio.*

Sed dices, ergo similiter propter hoc brachio laborante crus non potest scharificari fieri, sed reliquum brachium.

Sed diuersa est ratio 1. quia sanguis a partibus superioribus ad inferiora cum maiori velocitate pertransit, cum ex sua naturali gravitate iubet nature expulsiōem, & cum non detineatur (nisi pestilens sit humor) parum nocet, contra vero quādo ab inferioribus ad superiora atrahitur humor: quia cum maxime violentetur multum detinetur, in via, cuius ratione nocet brachium tamen contrarium, sciendi non debet.

quia preter quā quod nō seruat̄ur rectitudo similiter humor  
transit per mēbrum principale & cū maiori violencia, quia  
contrariatur naturæ motui qui est secundū rectū, & sic intel-  
ligatur Galeni doctrina quæ verissima est.

In omni vera pleuritide, si plenitudo sit, & vires consen-  
tiant, semper scindenda est vena vaslica eiusdem lateris. *3. Concl.*  
Dico in concl. si vires sint sufficientes, & plenitudo existat, nam  
quocūque horum deficiente, etiam si pleuritis vera existat,  
euacuatio non est exercenda. Prob. quia ad omnem sangui-  
nis missionem requiritur presentia ex postulantis & consen-  
sientis: sed si deficiunt: ergo & talis euacuatio, id Gal. affir-  
mat in 6. Epidem. vbi sine sanguinis missione quēdam egro-  
tum laborantem vera pleuritide, se curasse narrat, quod etiā  
quādo dolor parus est fieri potest, vt iubet Celsus dum ait  
superuacaneū esse auxiliū sanguinis missionē si leuior fuerit,  
pleuritis, quod etiā confirmat Iulianus, sic ne igitur teme-  
re sanguine dimittas, nec purges, vt vulgo sariunt, nisi exqui-  
site dēdideris humorē, qui inflammationē fecerit copiosū esse,  
& in toto corpore superare similiter Paulus, & Aetius docēt.

Hæc tamen concl. quod scilicet vena vaslica eiusdem late-  
ris scindenda sit, est magni medicinæ parentis Hipp. in 1. de  
morbis vbi de pleuritide agens hæc proponit verba, huic ve-  
nam scicare conducit in manu splenitidem appellatā, aut hepa-  
titudinem iusta, vtrā sane fuerit morbus, id similiter affirmat 4.  
acut. 73 dum ait si dolor supra ad clauem attingerit, vel cir-  
ca mammam, aut brachiū interiori in brachii venā scindere  
oportet ab ea parte quæcūque illa fuerit vbi est dolor, hæc  
Hippoc. quid clarius id similiter Galenus in com. confirmat,  
& docet, vt sic reliqua Hippoc. dicta circa hoc intelligantur,  
id etiam docet 2. acut. 10. vbi ait in pleurica inflammatione  
sanguinem esse mittendum ad mutationem coloris, sed ex  
latere opposito etiam si tetus quantus est in corpore euacues  
non mutabitur color: ergo ex eodē patet, mutatio fit quā-  
do cecit, quod contentū est in inflammatione: sed id per con-  
trariam partem non potest extrahi: ergo semper ex eodem  
latere est faciēda ista euacuatio ab Hippoc. proposita, id simi-  
liter docet Galen. 13. meth. cap. 11, & lib. de sanguinis missio-

ne cap. 16. vbi postquam vtriusque curationis fecit experientiam, ait quoniam & pleuriticis quæ edirecto laborantis lateris adhibita fuit sanguinis missio clarissimam sepe vtilitatem attulit, quæ vero ex brachio opposito, aut omnino obscuram, aut certe post temporis intervalum, & non de euacuatione est intelligendus, vt inuentor vult, nisi de reuulsione similiter, quia nullus ita cecuserat, cui necessarium esset advertere, ex latere opposito euacuationem humoris existentis in parte inflàmata fieri debere, quia si ad reuulsionem non seruat rectitudinem quo modo ad euacuationem, preter quàm quod in omnibus illis locis de principio inflàmationis loquitur, cum his tamen neoterici fere omnes conueniant, ne tempus in recitando autores conteramus frustra.

Ratione tamen prob. 1. ea vena est scindenda in pleuritide, quæ omnibus propositis indicationibus respondeat, scilicet quod reuelat, deriuat, & euacuet: sed ista omnibus correspondet. scilicet Vasilica eiusdem lateris: ergo ista semper est scindenda, quod vero deriuat & vacuet nulli dubium est: quia est proxima, & per communes venas, quod reuelat, prob. trahit sanguinem ad oppositum: ergo reuelit, quia reuulsio est aduocatio humorum contrario motu quæ habent, prob. trahit sanguinem ab intro ad extra, (quia vena ista respectu pleuræ est exterior licet interna sit facta cõparatione ad cutem, vt locum non habeat, quod de variolis asserti contrariæ opinionis defensor) & ab inferioribus ad superiora, quia brachium superius est ratione pectoris ergo reuelit.

Secundo prob. reuulsio exercenda est ad originem fluxionis, sed euacuatio facta ex eodem latere est huiusmodi ergo reuelit prob. pleuritis fere sepe fit ex de fluxione capitis: aut ex refrigeratione pectoris recõcetrato sanguine ad interiora: ergo aduocatio illius ad superiora, & exteriora trahit ad originem fluxionis, quod fit ista euacuatione, ergo semper est exercenda, & etiã si pars mãdans, sit vena cava, quod ex quisitum est, vt supra probabi aduc reuelit ad eam patet sanguis, qui exiit ex axillari prius euacuatur ex vena cava immediate, ergo ad eam renocat fluxionem & per consequens semper est scindenda.

Tertio prob. in morbis curatio tuto & cito est exercenda,

sed scilicet ista vena curatio fit tuto, & scito, ergo ista vena est  
scindenda prob. curatio fit tuto & scito in inflammationibus,  
quādo causa molestās aufertur, tan fluens, quā fluxa & cum  
minori virium dispendio: quia vnica salus in his inflamma-  
tionibus est virium robur ex Galeno, Sed hoc fit misso san-  
guine ex eodē latere. ergo semper est mittēdus, id prob. ista  
vena habet maiorē cōmunitatē cū partē. ergo magis de ma-  
teria in ea contenta euacuat, & est opposita ipsi parti: ergo  
reuelit & citius efficit, quod est necessarium in inflamma-  
tionibus, quod tutius & securius est.

Et confirmator id, & sit 4. argum. ea vena secari debet in  
pleuritide & aliis internis inflammationibus, quæ citius & ma-  
gis reuelat & euacuet a parte affecta: sed vena vasilica lateris  
affecti hoc prestat munus in pleuritide, ergo hæc & non alia  
secari debet maior prob. ex Gal. 2. acutorum 10 quia pleu-  
ritis sicuti alix interne inflammationes vrget sua acutio. & peri-  
culo, & nō prebet indolias, & ideo occasio remedii preceptus  
est, & dilatio periculosa, qua ratione huiusmodi morbus nō  
solum requirit magna remedia, sed etiam quæ celeriter su-  
currant parti affectæ, nam quæ celeritatem desiderant cele-  
riter sunt per agenda ex Hipoc. 1. acutor. 8. remedia enim si-  
cuti cum morbis contendunt magnitudine, sic etiam cum ce-  
leritate contendere debent (quæ occasio dicitur & præceptus  
ab Hipocrate) & in pleuritide non solum intendimus reuele-  
re, sed etiam id quod iam est fluxum euacuare minor prob.  
quia vena vasilica lateris affecti maiorem seruat rectitudinē  
cum parte affecta & maiorem consensum, tum ratione recti-  
positus partis, tum ratione venarum: ergo cum sufficiens sit  
distantia & contrarietas inter latus affectum & brachium, &  
maxima sit vasorum cōmunio celeriter, & efficaciter reue-  
let illius venæ seccio, & fluxum humorum euacuanit.

His sic propositis ad argumenta contraria satisfacimus, *Resp.*  
& ad primū de vulnere existente in vna thoracis parte nega-  
mus, quod ex altera sanguis sit mittendus, quia nulla serua-  
tur rectitudo, vt diximus, nisi ex pede & non quia magis cō-  
citaretur fluxus si ex eodem brachio mitteremus sanguinē  
sed quia in isto casu solum requiritur ex quibus & sola reuel-

siō & latus propter fluxionem vultus est inanicum, quia si plenum esset cum dolore & inflammatione mitterem certe ex eodem & in hoc sensu seruetur paritas inter pluritudem, & hunc casum non vero, vt proponitur.

Ad 2. quod probat eandem esse rationem precautionis & curationis negamus hoc, quia licet eisdem remediis curare, & preseruare debeamus, nō tamen eis eodem modo applicatis, quia proter maiorem necessitatem, aut cū maiori celeritate, aut in maiori quāritate, aut ex proximiori loco sunt exercenda, & licet eadem causa, quę incepta causat effectū, ipsa cōtinuata cū foueat nihilominus eadē diuerso modo indicat quando incipit, quā quando iam est fluxa, quia primo solum ex postulat reuulsionē, postea tamen deriuationē, & sic intelligendus est Gal. lib. de sanguinis missione 19. quando asserit quibus vero pars quępiā, nisi prius vacuati fuerint præcipue infestatur, aut eque ex quauis parte euacuationē moliri oportet, sed perinde ac in iis quę iā laborare incipiunt, &c. Id est veluti in morbo particulari presente est necessariū, quod ligatur vena quę rectitudinē seruet cum affectu sic, & in precautionē affectus particularis, quod diuersum est in morbis vniuersalibus in quibus nulla requisita est electio nō vero, vt inuenitur vult cum Argenterio lib. artis medicę com. 3. easdē venas sciendūdas esse in precautionē & curatione, quod falsum esse ex eodē Gal. patet in fine cap. propositi, vbi omnia quę proposuerat resumens, ait cōmunis igitur in his omnibus, qui vere inuenite ad sanguinis missionē veniunt hæc ratio est siquidē præcipue infirmā aliquā partē habent in quā quę coaceruatur plenitudo decumbat reuulsorie, vt euacuemus, si vero tale nihil sit vnde cunque magis placebit, & quod hæc sit vera ratio confirmatur ex eo, quod in morbo imminente solum est causa parata fluere cui reuulsio distatissima debetur, vt ad aliā partē natura cōsuetudinē assummat, tamen in præsentī morbo est causa fluere parata, & iam fluēs & fluxa ex quibus diuersis causę motionibus variz de sumuntur indicationes quibus occurrēdum est, ergo diuerso modo in precautionē, & curatione est procedendum, & sic est Galenus intelligendus in præsentī, vt cōsuet acutissimus Vei

ga librō artis medicæ 95. & Fufius in præfenti Petrus de Peramato de uacuãdĩ ratione 28. & inter omnes præfatisfime magifter meus doctiffimus Rodericus de Soria fuper Auic.

Ad 3. quod probat ex Gal. longiffime a parte inflammata aduocãdos effe humores refpõdetur, quod Galenus eft intelligendus feruatis feruandis hoc eft quã longiffime ellegi poffit dum modo feruetur reftitudo & omnibus ex poffulanti- bus indicationibus correfpondeat, & quia quando vrget af- fectus, & præfens eft, non præftrat indutias ex pectãdi, eligen- da eft vena, quæ cicius & directius locũ refpiciat, & hæc fem- per diftantiffima non eft, licet femper debeat effe cõtraria, & ideo in ipfo 13. meth. vbi fententiã hæc Gal. affert eam exẽ- plis declarat fiquidẽ in inflãmationibus oculorũ laudat fle- boroniã excephalica & in pectore ex vafilica, quæ magis di- ftas affectas partes refpiciũt, & quando absolute ex diftantif- fima docet, eft in præferuatione, vt cõftat ex ipfo 2. de natu- ra humana tex. 9. in ex opofitione illius Hip. tex. & lib. artis medicæ 99. cum de remedis præfentibus agat, nõ verò mor- bo exiftente præfente, & non eft quod dicas in illis exẽplis de cõfiftente morbo effe intelligendũ, nam ipfi Gal. eft cõ- traria refponfio ifta fiquidẽ de principiis morborũ loquitur, in quo tẽpore fanguinis miffio locũ habet, nam in choanti- bus morbis flebotomia exercetur, & ad rebelendum præci- pue, vt ipfe in toto illo capite fcirato docet.

Ad 4. verò refpondemus concedendo maiorem, quod fi- licet in principio inflãmationis fit fluxio & quod fit reuulfio exercenda, quod ex eodem brachio non fiat negamus & ad probationem maiorem damus, negamus tamen minorem, quia fanguinis miffio ex proprio latere aduocat humores a centro ad circumferentiam & ab inferioribus ad fuperiora, qui funt contrarii motus.

Ad 5. & vltimum refpondetur concedendo, quod fi ori- go fluxionis cognofcatur, femper ad ipfam eft reuocandus humor dũ modo morbus nõ tantũ vrgeat, vt relicto regimi- ne caufæ ad ipfum accedamus tamẽ quod femper fit vena ca- ba origopleuritidis negamus vt fupra in 4. notabili probabi- mus & licet cõtingat, quod ex quifitũ erit, etiã fanguinis miffio

flo ex eodē latere ad originē fluxionis aduocat humores n̄z  
 si a capite proueniat talis euacuatio ab inferioribus ad supe-  
 riora reuelit si ab externis ad exteriora aduocat illos tamē si a  
 vena caua iterū ad ipsam aduocat humores prius quā ad bra-  
 chiū per veniāt, quia tan vna, quam altera axiliaris vena ab  
 vno trunco scilicet, vena caua equaliter visurcatur, & secun-  
 dū hoc tan vna, quam altera, ex ipsa vena cava deponit san-  
 guinem & reuelit ad illam tamē axiliaris eiusdē lateris pre-  
 ter hoc habet aliam cōmunicationē factam per ramum cō-  
 municatū oscula osculis per anastomosis cum ramulis ve-  
 niz, sine cōiugē cuius ratione nō solum euacuat ex vena caua  
 reuelendo, sed ex proximis partibus deriuando & euacuan-  
 do, quia eadē pars est remota propter visurcationē factam  
 in vena caua & proxima propter cōmunicationem factam  
 in altero ramo dicto, vt latius ex anathome cōstat vnde pa-  
 tet, quod ratio illa, quod vna & eadē pars nō potest esse pro-  
 xima & remota nullā habet vim quando pars habet diuersas  
 cōmunicationes cū affecta parte, vt ista vena dicta, nā si vna  
 tantam esset cōmunicatio bene probabat, ergo semper ad  
 originem fluxionis, vt ipse ait & nos cōcedimus aduocādus  
 est & aduocatur humor misso sanguine ex eodē latere, quod  
 semper est & debet esse perpetuum.

Loci tamen Hipocratis & Galeni pro se aducti nihil con-  
 tra nos probant, vt ex dictis patet nam locum autoris de na-  
 tura humana Galenus ipse explicat, quod de precautionē in-  
 telligatur, quod affert ex Galeno in 13. meth. cōcedimus, sed  
 diuersa est ratio in inflammationibus exterioribus quę indutias  
 dant expectādi quam in interioribus quę semper vrgēt, pre-  
 ter quā quod in exterioribus nō est cōtrarietas ab intro ad ex-  
 tra, & sic est necessaria quę sit ad lōginqua Actii tex. ex Ar-  
 chigenis sententia est nō vero ex sua dictum Celsi in exteriori-  
 bus intelligitur, quod ex Auicena affert in probamus tan-  
 quam falsum id veritatis in veniēdi desiderio proposui non  
 contradicendi animo pręcipue mihi amicissimo quem alias  
 summo opere diligo, sed licet amicissimus magis amica veri-  
 tas quę in retā graui summo opere est amplectēda.